

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 27-6-75058713

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, INDRE-ET-LOIRE, EURE-ET-LOIR)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - 45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

Téléphone : 86-36-24

ABONNEMENT ANNUEL : 50 F

M. le Sous-Régisseur de recettes
de la Protection des Végétaux
93, RUE DE CURAMBOURG
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
C. C. P. : La Source 4604-25

BULLETIN TECHNIQUE N° 62

MILDIOU DE LA VIGNE

24 JUIN 1975
VIGNES

L'état sanitaire du vignoble est en général satisfaisant. Toutefois, depuis notre bulletin du 16 Juin, de nouvelles taches sont apparues dans la plupart des régions viticoles. Quelques petits foyers peu importants ont même été signalés.

Les pluies des 21, 22 et 23 Juin ont été en général insuffisantes pour lessiver le traitement conseillé dans notre bulletin du 16 Juin. Cependant, localement, elles ont été assez abondantes pour que les vignes ne soient plus protégées.

Dans ces dernières situations et dans les vignes où des foyers auraient été découverts, un nouveau traitement est donc conseillé avant la fin de cette semaine. Dans les autres situations, on peut attendre la fin de la floraison si de nouvelles pluies ne surviennent pas entre temps pour lessiver la dernière application. Dans ce cas, une nouvelle intervention qui sera précisée dans un prochain bulletin serait à prévoir 5 à 7 jours après ces pluies.

On considère actuellement que 15 à 20 mm de pluie en une seule fois ou 20 à 25 mm de pluies cumulées sont nécessaires pour lessiver un traitement.

BLACK ROT DE LA VIGNE

Le traitement dirigé contre le mildiou de la vigne sera efficace contre le black rot à condition de respecter les doses d'emploi qui ont été précisées contre cette maladie dans le numéro de Mars de la revue "PHYTOMA".

OIDIUM

Les conditions climatiques actuelles sont très favorables à l'oidium dont les manifestations sont parfois nombreuses dans certaines vignes. Il est conseillé de profiter de la floraison pour effectuer un soufrage.

MILDIOU

POMME DE TERRE

Jusqu'à ces derniers jours, les conditions climatiques ont été peu favorables au mildiou de la pomme de terre mais les pluies récentes, localement abondantes, ont pu être à l'origine des premières contaminations dont les manifestations risquent de passer inaperçues. Il est donc prudent de protéger une végétation maintenant bien développée.

En conséquence, un premier traitement est conseillé à la fin de cette semaine sur toutes les cultures non destinées à un prochain arrachage avec l'un des produits mentionnés dans la liste parue dans la revue "PHYTOMA" du mois de Mars 1975.

Nous rappelons que le concours pour la détection des foyers primaires de mildiou est toujours ouvert et nous demandons aux agriculteurs de bien vouloir nous envoyer les taches qu'ils pourraient observer dans leurs cultures ou sur les repousses issues, soit de cultures précédentes, soit de tas de déchets.

SEPTORIOSE DU CELERI

CULTURES LEGUMIERES

Les pluies orageuses sont très favorables à l'apparition et au développement de la maladie. En conséquence, il est conseillé de protéger les cultures avec l'un des produits cités dans le bulletin n° 52.

La protection sera poursuivie en tenant compte du développement de la végétation et du lessivage par les pluies ou les arrosages.

Les Ingénieurs chargés des
Avertissements Agricoles

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription phytosanitaire "CENTRE"

G. RIBAUT
B. LELIEVRE

G. BENAS